

どんな間隔で
受けたらいいの？



- ① 予防接種で使うワクチンには＜生ワクチン＞と＜不活化ワクチン＞があります。令和2年10月1日予防接種法改正により、注射生ワクチンから異なる注射生ワクチンを行うまでの間隔のみ27日以上おくことに変更されました。なお、同じ種類のワクチンを複数回接種する場合には、それぞれ定められた間隔があるので、間違えないようにしてください。
- ② 定期接種・任意接種に該当するワクチンの種類は、年度の途中で変更となる可能性があります。詳細は、泉佐野市のホームページ又は広報で確認してください。

＜注射生ワクチン＞を接種した場合
【定期】 BCG・MR・麻しん・風しん・水痘
【任意】 おたふくかぜ等

他の異なる注射生ワクチンを受ける場合、
27日以上あける。
(4週間後の同じ曜日から接種できます。)

＜注射生ワクチン＞

＜お勧めの接種スケジュール（例）＞

このスケジュール例は、定期予防接種の『望ましい接種期間の例』を表示しています。丸囲み数字(①、②など)は、ワクチンの種類毎に接種の回数を示しています。

	標準的な 接種(開始)期間	2 カ 月	3 カ 月	4 カ 月	5 カ 月	6 カ 月	7 カ 月	8 カ 月	9 カ 月	10 カ 月	11 カ 月	12 カ 月	15 カ 月	18 カ 月	2 歳	3 歳	4 歳	5 歳	6 歳	7 歳	8 歳	9 歳	10歳以上
ロタリックス	初回 生後2か月～ 出生14週6日後まで	①②																					
ロタテック	初回 生後2か月～ 出生14週6日後まで	①	②	③																			
BCG	生後5か月の前日 ～8か月の前日					①																	
B型肝炎	生後2か月の前日～ 9か月の前日	①	②					③															
小児用 肺炎球菌	生後2か月の前日～ 7か月の前日	①	②	③											④								
ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ Hib (DPT-IPV-Hib)	生後2か月の前日～ 1歳の誕生日の 前日	①	②	③											④								
ジフテリア 百日せき 破傷風 不活化ポリオ (DPT-IPV)	生後2か月の前日～ 1歳の誕生日の 前日	①	②	③											④								
インフルエンザ菌b 型 (Hib)	生後2か月の前日～ 7か月の前日	①	②	③											④								
水痘	1歳の誕生日の前日 ～ 1歳3か月の前日											①			②								
麻しん・風しん (MR) 1期	1歳														①								
麻しん・風しん (MR) 2期	年長児																						①
日本脳炎 1期	初回 3歳 追加 4歳																①②③						
日本脳炎 2期	9歳																						①
ジフテリア 破傷風 (DT) 2期	11歳 (小学校6年生)																						①
ヒトパピローマ ウイルス 感染症予防 (HPV) (子宮頸がん予防)	中学校1年生の女子																						①②③

※確実に免疫をつくるためには、決められたとおり接種を受けることが大切です。
※長期にわたり療養を必要とする疾病等で接種対象期間内に予防接種を受けることができなかった場合、後に定期の予防接種として接種できる場合がありますのでご連絡ください。